

GUÍA DE VACUNACIÓN

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

¿Qué es la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad aguda, infecciosa, producida por un virus perteneciente al género Flavivirus. El hombre contrae la infección como consecuencia de la picadura de un mosquito infectado, el cual pertenece al género *Aedes aegypti*. Los virus son inyectados a nivel del tejido celular subcutáneo y, luego de reproducirse localmente, se disemina por todo el organismo al alcanzar el sistema circulatorio.

En América, la infección se encuentra controlada gracias a los esfuerzos realizados para erradicar a los mosquitos y con el desarrollo de una vacuna; aunque en algunas regiones selváticas se han registrado algunos casos.

Se la encuentra en las regiones tropicales y en todo el continente Americano, en donde la cantidad de casos notificados se ha incrementado marcadamente como consecuencia de la aparición de brotes epidémicos en África con un elevado número de muertes.

Su incidencia mundial es de aproximadamente 1000 personas por año notificadas oficialmente (se cree que la verdadera podría ser de 200 veces mayor), de las cuales el 15 al 20% fallece.

¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

- Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a, o viven en, un país que requiere que ciertos viajeros se vacunen contra la fiebre amarilla. Consulte a su proveedor de salud.
- Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a un país que no requiera la vacunación contra la fiebre amarilla pero que está ubicado en una zona donde se sabe que existe el riesgo de la fiebre amarilla. Consulte a su proveedor de salud.
- Si sigue viviendo en, o viajando a, lugares en los que la fiebre amarilla es endémica, debe recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla después de 10 años.
- La vacuna contra la fiebre amarilla se puede dar al mismo tiempo que la mayoría de las demás vacunas.

¿Quiénes NO deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

Las personas que alguna vez tuvieron una reacción alérgica, que puso en peligro su vida, a huevos, pollo, gelatina o a una vacuna anterior contra la fiebre amarilla.

Los bebés menores de 9 meses de edad. En el caso de bebés de 6 a 8 meses de edad que no pueden evitar viajar a una zona de fiebre amarilla, hable con su médico sobre la vacunación. En ninguna circunstancia se debe vacunar a los bebés menores de 6 meses de edad.

Las mujeres embarazadas y las madres que estén amamantando deben evitar o aplazar el viaje a zonas de fiebre amarilla. Si el viaje es inevitable, hable con su médico sobre la vacunación.

Consulte a su médico antes de vacunarse contra la fiebre amarilla si:


1. Ha tenido en el pasado alergia a los huevos, el pollo, o la gelatina.
2. Tiene VIH/SIDA o alguna otra enfermedad que afecte el sistema inmunológico.
3. Ha estado bajo tratamiento por 2 semanas o más con medicamentos que afectan el sistema inmunológico, tales como esteroides.
4. Tiene algún tipo de cáncer.
5. Le están haciendo tratamiento contra el cáncer con rayos X o con medicamentos.
6. Le sacaron la glándula timo o ha tenido problemas con el timo, tales como miastenia gravis, síndrome del DiGeorge, o timoma.

Si tiene 65 años de edad o más, hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de la vacunación, comparados con su riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla en el lugar al que viajará.

Si por algún motivo médico no se puede vacunar y el lugar al que viajará requiere prueba de vacunación contra la fiebre amarilla, su médico le puede dar una carta de exención. Si tiene en mente usar una carta de exención, también debe obtener asesoramiento específico de la embajada del país o de los países a los que piense visitar.

Si no se puede vacunar, hable con su médico sobre otras maneras de prevenir la fiebre amarilla.

CERTIFICADO DE FIBRE AMARILLA EXPEDIDO POR EL ORGANISMO DE SALUD



La vacuna es gratuita. Deben concurrir con DNI, pasaporte o cédula de identidad.

Lugares para aplicarse la Vacuna contra la Fiebre Amarilla

BUENOS AIRES

Lugares de Vacunación

Dirección de Sanidad de Fronteras (Se aplica de manera gratuita)

Dirección: Avda. Ingeniero Huergo 690. Cap. Fed

TEL: 4343-1190/ 4334-1875.

Horario: De lunes a viernes lunes de 10 a 15 hs.

Dr. Stamboulian

TEL: 4515-3000

www.drstamboulian.com.ar

Hospital Alemán

Dirección: Av. Pueyrredón 1640

TEL: 4827-7000

www.hospitalaleman.com.ar

Lunes a viernes de 10.30 a 11.30hs y de 13.30 a 14.30hs.

ROSARIO

Lugares de Vacunación

- **Hospital San Lorenzo**
Richieri 347, San Lorenzo 2do y 4to jueves de 8 a 12 hs.
- **Hospital Samco Villa Constitución**
Bolívar 1600, V. Constitución.- 1er y 3er jueves de 8 a 12 Tel 03400 47-3448
- **Hospital Centenario**
Urquiza 3101, Rosario. 1er y 3er miércoles de 7 a 10 hs. Tel 0341- 4306753
- **Hospital Provincial**
Alem 1450, Rosario. 2 do y 4to martes de 10 a 14 hs. Tel 0341- 4801400
- **Unidad Sanidad de Fronteras**
Av. Belgrano 836, Rosario. Lun, miérc y vier de 10 a 12 Tel 0341- 4484971
- **Hospital Eva Perón**
Avda. San Martín 1465.Gdro. Baigorria (jueves y viernes de 10 a 12 hs.
- **Hospital Carrasco**
Martes y jueves de 10 a 12 hs. 0341- 4804155
- **Hospital Alberdi**
Puccio 575 Lunes y martes de 8 a 10 hs. TEL 0341- 4806177

CÓRDOBA

Lugares de Vacunación

- **SANIDAD DE FORNTERAS**
(Sanidad de Fronteras Córdoba del Ministerio de Salud de la Nación). Días martes, miércoles y jueves de 12:30 a 13:00 hs. Calle 9 de Julio 356.
- **Centro VACUNAR**
Lunes a viernes
de 9.00 a 19.30 hs
Sabados: 9.00 a 13.00 hs Gregorio Gavier 2085 Cerro de las Rosas
- **Hospital Pediátrico del Niño Jesús**
(Castro Barros 650), de 8 a 20
Teléfono (0351) 434-6060 – 69
- **Hospital Misericordia** (Ayacucho 1608), de 8 a 16.